

WIEK		SZCZEPNIENIE PRZECIW
1. ROK ŻYCIA	W CIĄGU 24 GODZIN PO URODZENIU	WZW typu B – domięśniowo (pierwsza dawka) gruźlicy – śródskórnio szczepionką BCG
	2. MIESIĄC ŻYCIA (7.–8. TYDZIEŃ)	WZW typu B – domięśniowo (druga dawka)[a] błonicy, tężcowi, krztuścowi – podskórnio lub domięśniowo szczepionką DTP (pierwsza dawka) zakażeniom Haemophilus influenzae typu b – podskórnio lub domięśniowo (pierwsza dawka)
	3.–4. MIESIĄC ŻYCIA (PO 6–8 TYGODNIACH OD POPRZEDNIEGO SZCZEPIENIA)	błonicy, tężcowi, krztuścowi – podskórnio lub domięśniowo szczepionką DTP (druga dawka) poliomyelitis – podskórnio lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (pierwsza dawka)[b] zakażeniom Haemophilus influenzae typu b – podskórnio lub domięśniowo (druga dawka)
	5.–6. MIESIĄC ŻYCIA (PO 6–8 TYGODNIACH OD POPRZEDNIEGO SZCZEPIENIA)	błonicy, tężcowi, krztuścowi – podskórnio lub domięśniowo szczepionką DTP (trzecia dawka) poliomyelitis – podskórnio lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (druga dawka) zakażeniom Haemophilus influenzae typu b – podskórnio lub domięśniowo (trzecia dawka)
	7. MIESIĄC ŻYCIA	WZW typu B – domięśniowo (trzecia dawka)
2. ROK ŻYCIA	13.–14. MIESIĄC ŻYCIA	odrze, śwince, różyczce – podskórnio żywą szczepionką skojarzoną

		(typu MMR) (pierwsza dawka)[c]
	16.–18. MIESIĄC ŻYCIA	<p> błonicy, tężcowi, krztuścowi – podskórnio lub domięśniowo szczepionką DTP (czwarta dawka)</p> <p> poliomyelitis – podskórnio lub domięśniowo szczepionką IPV poliwalentną(trzecia dawka)</p> <p> zakażeniom <i>Haemophilus influenzae</i> typu b – podskórnio lub domięśniowo (czwarta dawka)</p>
OKRES PRZEDSZKOLNY	6. ROK ŻYCIA	<p> błonicy, tężcowi, krztuścowi – domięśniowo szczepionką DTaP zawierającą bezkomórkowy komponent krztuśca</p> <p> poliomyelitis – doustnie szczepionką atenuowaną poliwalentną OPV – I dawka przypominająca</p>
SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM	10. ROK ŻYCIA	odrze, śwince, różyczce – podskórnio żywą szczepionką skojarzoną[d]
	11. ROK ŻYCIA	odrze, śwince, różyczce – podskórnio żywą szczepionką skojarzoną[e][d]
	12. ROK ŻYCIA	odrze, śwince, różyczce – podskórnio żywą szczepionką skojarzoną[f][c]
	14. ROK ŻYCIA	<p> WZW typu B – domięśniowo trzykrotnie w cyklu 0-1-6 miesięcy[g]</p> <p> błonicy, tężcowi – podskórnio lub domięśniowo szczepionką Td</p>
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA	19. ROK ŻYCIA LUB OSTATNI ROK NAUKI W SZKOLE	<p> błonicy, tężcowi – podskórnio lub domięśniowo szczepionką Td[h]</p>

